

Taula 3. Evidència clínica disponible per al racecadotril

Críteris d'inclusió	NRE	Braços de tractament	Resultats
Salazar-Lindo et al., 2000 [20]			
Diarrea líquida ≤ 5 dies de durada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 3 DD/dia (< 24 h IH), ▪ o ≥ 1 DD/dia (< 4-5h IH) 	135	A. Racecadotril (1,5 mg/kg/8h) + SRO (nre. = 68) B. Placebo + SRO (nre. = 67)	RDD a les 48 h: significativament inferior en el grup A comparat amb el B (p < 0,001) Durada de la diarrea: significativament inferior en el grup A (p < 0,001)
Cézard et al., 2001 [21]			
Diarrea líquida ≤ 5 dies de durada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≥ 3 DD/dia durant com a mínim 72 h 	172	A. Racecadotril (1,5 mg/kg/8h) + SRO (nre. = 89) B. Placebo + SRO (nre. = 83)	RDD a las 48 h: significativament inferior en el grup A comparat amb el B (p < 0,001) Durada de la diarrea: significativament inferior en el grup A (p = 0,02)
Cojocarú et al., 2001 [22]			
Diarrea líquida: <ul style="list-style-type: none"> ▪ >3 DD/12h 	166	A. Racecadotril (3 x 10 mg/dia pes corporal < 9 kg; 3 x 20 mg/dia pes corporal > 9 kg) (nre. = 81) B. Sense intervenció (nre. = 83)	Durada de la diarrea: significativament inferior en el grup A (97,2 ± 36 h vs. 138 ± 42 h)

DD : deposicions diarriques; **IH** : ingrés hospitalari; **nre** : nombre de participants;
RDD : reducció de deposicions diarriques; **SRO** : sèrum de rehidratació oral.