

Taula 4. Evidència clínica disponible per a tannats/tannat de gelatina

Criteris d'inclusió	NRE	Braços de tractament	Resultats
Loeb et al., 1989 [25]			
<ul style="list-style-type: none"> Deshidratació moderada (5-8%) Diarrea líquida: <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 4 DD/dia (< 24 h IH) 	41	A. Preparat amb tannat (1,5 g/kg/dia) durant 6 dies (n = 21) + SRO B. Placebo + SRO (n = 20)	Durada de la diarrea: significativament inferior en el grup A comparat amb el B ($2,0 \pm 0,27$ vs. $3,75 \pm 0,30$ dies, respectivament; $p < 0,001$)
Esteban Carretero et al., 2009 [23]			
<ul style="list-style-type: none"> Edat: 3 meses a 12 anys Diarrea líquida ≤ 72 h: <ul style="list-style-type: none"> - ≥ 3 DD/dia 	211	A. Tannat de gelatina + SRO (n = 97) B. SRO (n = 114)	DD (mitjana) a las 12 h: A: $6,19 \pm 2,95$ per a $2,06 \pm 1,04$; B: $7,26 \pm 2,95$ per a $5,86 \pm 2,45$; ($p = 0,02$)

DD : deposicions diarreiques; **IH** : ingrés hospitalari; **nre** : nombre de participants;
RDD : reducció de deposicions diarreiques; **SRO** : sèrum de rehidratació oral.