

TAULA 6. Tractament que s'hauria de considerar indicat en el malalt geriàtric**SISTEMA CARDIO-VASCULAR**

1	Anticoagulants orals en malalts amb fibril·lació auricular
2	Aspirina en malalts amb fibril·lació auricular on els anticoagulants orals estan contraindicats
3	Aspirina o clopidogrel en malalts amb antecedents de malaltia ateroscleròtica coronària, cerebral o perifèrica en ritme sinusal
4	Teràpia antihipertensiva en malalts amb tensió sistòlica superior a 16mm Hg
5	Estatines en malalts amb antecedents documentats de malaltia vascular coronària, cerebral o perifèrica amb estatus funcional independent per les activitats de la vida diària i una esperança de vida superior a 5 anys
6	IECA en malalts amb insuficiència cardíaca crònica
7	IECA en malalts després d'infart de miocardi
8	Beta blocadors adrenèrgics en malalts amb angina estable crònica

SISTEMA RESPIRATORI

1	Beta adrenèrgic estimulants o anticolinèrgics inhalats en malalts amb asma o MPOC fins i tot lleu o moderat
2	Corticoides inhalats de forma continuada en malalts amb asma o MPOC, FEV1 < 50%
3	Oxigen domiciliari en malalts amb insuficiència respiratòria tipus I (pO2 < 60mmHg, pCO2 < 49mm Hg) o insuficiència respiratòria tipus II (pO2 < 60mm Hg, pCO2 > 49mm Hg)

SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

1	L-dopa en malaltia de Parkinson idiopàtica amb alteració funcional que genera discapacitat
2	Antidepressius en presència de símptomes depressius moderats/greus de durada al menys de tres mesos

APARELL GASTROINTESTINAL

1	Inhibidors de la bomba de protons en malalts amb reflux gastro-esofàgic greu o malaltia péptica que requereix dilatació
2	Suplements de fibra en malalts amb malaltia diverticular amb constipació

SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC

1	Modificadors de malaltia antireumàtica en pacients amb malaltia reumatoide moderada/greu de més de 12 setmanes
2	Bifosfonats en malalts a qui s'administra corticoides de forma continuada
3	Calci i vitamina D en malalts amb osteoporosi

SISTEMA ENDOCRÍ

1	Metformina en malalts amb diabetis tipus II ± síndrome metabòlica en absència d'insuficiència renal amb depuració de creatinina superior a 50ml/min
2	IECA o ARA II en malalts diabètics amb nefropatia (proteinúria o microalbuminúria (>30mg/24h) ± insuficiència renal depuració de creatinina inferior a 50ml/min)
3	Antiagregants plaquetaris en malalts amb diabetis i factors de risc cardiovascular
4	Estatines en malalts diabètics si hi ha present factors de risc cardiovascular

