

TABLA 4. Indicadores de calidad en tratamientos de enfermos geriátricos propuestos por ACOVE (Assessing Care of Vulnerable Elders).

1	Disposición de perfil terapéutico completo
2	Revisión periódica del perfil terapéutico
3	Revisión de la indicación de cada uno de los medicamentos
4	Educación del enfermo
5	Revisión de objetivos terapéuticos
6	Monitorización de enfermos con tratamiento anticoagulante oral
7	Educación específica a enfermos en tratamiento con anticoagulante oral
8	Monitorización del potasio sérico en enfermos en tratamiento con IECA
9	Monitorización de enfermos en tratamiento con diuréticos
10	Evitar propoxifeno
11	Evitar el uso crónico y dosis altas de benzodiazepinas
12	Evitar el uso de medicamentos anticolinérgicos
13	Evitar barbitúricos
14	Evitar meperidina
15	Evitar el uso crónico de ketorolaco
16	Evitar ticlopidina
17	Tratar la anemia ferropénica con dosis bajas de hierro
18	Monitorización de tratamientos antipsicóticos
19	Paracetamol a dosis superiores a 3g
20	Aspirina y AINE deben considerarse factores de riesgo de hemorragia digestiva alta
21	Considerar la necesidad de profilaxis de la hemorragia digestiva alta en enfermos con factores de riesgo y tratamiento con aspirina y AINEs