

**Tabla 7. Medicamentos con actividad anticolinérgica**

Grupo Farmacológico	Actividad anticolinérgica			
	Sin actividad o mínima*	+	++	+++
<b>Analgésicos</b>	Fentanilo Dextropropoxifeno			
<b>Antidepresivos</b>	Duloxetina	Citalopram Escitalopram Fluoxetina Mirtazapina	Nortriptilina Paroxetina	Amitriptilina Doxepina
<b>Antidiabéticos</b>	Metformina			
<b>Antihistamínicos</b>			Difenhidramina	
<b>Antiinfecciosos</b>	Amoxicilina Cefalexina Levofloxacino			
<b>Antipsicóticos</b>		Quetiapina	Clorpromazina Olanzapina	Clozapina
<b>Ansiolíticos</b>		Diazepam	Temazepam	
<b>Medicamentos Cardiovasculares</b>	Digoxina Furosemida			
<b>Medicamentos para la demencia</b>	Donepezilo			
<b>Medicamentos del tracto gastrointestinal</b>	Difenoxilato Lansoprazol	Ranitidina		Atropina Diciclomina L- hiosciamina
<b>Anticonvulsivantes</b>	Fenitoína Topiramato	Litio		
<b>Medicamentos para la incontinencia urinaria</b>			Oxibutinina (formas retardadas)	Tolterodina

\*No presenta actividad anticolinérgica a dosis terapéuticas, pero sí la puede presentar en caso de sobredosificación o bien superando por otros motivos la Cmax estándar.


































\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_