

CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS APÒSITS SEGONS INDICACIÓ

INDICACIONS	GRUP	Noms comercials	PRECAUCIONS/CONTRAINDICACIONS
Protecció de la pell sana	Àcids grassos hiperoxigenats	Corpitol®, Linovera®, Mepentol®	Evitar massatges agressius. No es coneixen contraindicacions
	Poliuretà transparent	Askina®, Bioclusive®, Biofilm®, Hydrofilm®, Opsite®, Tegaderm®	No utilitzar en úlceres infectades
	Hidrocol.loid extrafí	Algoplaque®, Askina biofilm transparente®, Comfeel®, Hydrocoll®, Sureskin II thin®, Tegaderm Hydrocolloid Thin®, Tegasorb Thin®, Varihesive Extrafino®	
	Pomada d'òxid de zinc	Anticongestiva Cusi®, Pasta Lassar®, Triple Care Extraprotectora®	Retirar amb vaselina
Promoure la granulació i l'epitelització.	Malla impregnada	Adaptic®, Atrauman®, Linitul®, Grassolind®, Unitul®	No utilitzar en ferides exsudades perquè pot augmentar la maceració del teixit sa
	Silicona en malla	Mepitel®	
	Hidrogel placa	Hydrosorb®, Hydrosorb comfort®, IntraSite Conformable®, Tenderwet®	
	Hidrogel en gel	IntraSite gel®, Normlgel®, Nugel®, Purilon gel®, Varihesive hidrogel®	
	Hidrocol.loid en malla	Physiotulle®, Urgotul®	
	Hidrocol.loid gel (estructura amorfa)	Askina gel®, Comfeel®, Hydromed®, Ulcuflex®, Varihesive gel control®	No utilitzar en ferides infectades
	Hidrocol.loid	Algoplaque®, Askina biofilm S®, Askina Ulcuflex®, Comfeel®, Hydrocoll®, Nuderm®, Sureskin II®, Tegaderm Hydrocolloid®, Varihesive gel control®	No utilitzar en ferides infectades
	Col·lagen	Catrix polvo de colageno®	
	Enzims (col.lagenasa)	Irujol mono®	No utilitzar en gangrena seca Protegir la pell perilesional
Desbridament	Hidrocol.loid i hidrogel	Veure els corresponents apartats d'aquesta taula	No utilitzar en gangrena seca Protegir la pell perilesional
	Hidrogel + escuma	Nugel®	
Control de l'exsudat	Permanaganat potàssic 1/10000	Fórmula magistral	Tenyeix la roba
	Escumes (apòsits hidropolimèrics, apòsits hidrocel·lulars o foam)	Alione®, Allevyn®, Askina Transorbent®, Biatain®, Cellosorb®, Combiderm N®, Indafoam®, Indafoam adhesivo®, Mepilex®, PermaFoam Comfort®, Tegaderm foam®, Tielle®, Tielle XTRA®, Versiva®	
	Alginats (exsudat abundant)	Algisite®, Algisite M®, Algosteril®, Askina Sorbsan®, Melgisorb®, Seasorb Soft®, Sorbalgon®, Tegaderm alginate®, Tegagen HI®, Trionic®, Urgosorb®	No utilitzar en ferides seques o teixit necròtic sense exsudat

INDICACIONS	GRUP	Noms comercials	PRECAUCIONS/CONTRAINDICACIONS
Control de l'exsudat	Hidrofibra d'hidrocol.loid	Aquacel®	
Olor	Carbó adsorbent	Askina Carbosorb®, Carboflex®	
	Carbó amb plata	ActisorbPlus®	
	Metronidazole	Metronidazol Viñas gel®, Rozex gel®	
Úlceres infectades	Antisèptics (derivats iodats)	Clorhexidina, Povidona Iodada□	Compostos iodats: perill d'absorció sistèmica
	Apòsits amb plata	Acticoat®, Actisorb Plus 25®, Algisite Ag®, Allevyn Ag®, Aquacel Ag®, Askina Calgittrol®, Atrauman Ag®, Biatain Ag®, Biatain Plata adhesivo®, Cellosorb Ag®, Comfeel plata®, Urgotul plata®, Urgotul sulfadiazina Ag®	Precaució en al·lèrgia a la plata o a altres metalls. Precaució en al·lèrgia a la plata o a altres metalls. El temps d'utilització cal que sigui limitat (com l'antibiòtic) No combinar-los amb col.lagenasa Acticoat® s'activa amb aigua
	Antibiòtics tòpics		
	Sulfadiazina argèntica	Silverderma®	Contraïndicada la utilització rutinària Al·lèrgia a la plata o altres metalls
	Metronidazole	Metronidazol Viñas gel®, Rozex gel®	
Dermatitis exsudatives	Permanaganat potàssic 1/10000	Fórmula magistral	
	Sulfat de coure 1/1000	de 10 a 20 minuts, fonents damunt la zona lesionada.	
	Sulfat de zinc 1/1000		
	Corticoides tòpics		El temps d'utilització cal que sigui limitat

Adaptació de: *Úlceras cutáneas: empecemos por abordar las causas (Parte II)*. Infac. vol 16(9) 2008.

Font d'informació pels noms comercials; <https://botplusweb.portalfarma.com/botplus.asp> (consultat març 2011).