

**TAULA 4. Indicadors de qualitat en tractaments de malalts geriàtrics proposats per ACOVE (Assessing Care of Vulnerable Elders).**

1	Disposició de perfil terapèutic complet
2	Revisió periòdica del perfil terapèutic
3	Revisió de la indicació de cadascun dels medicaments
4	Educació del malalt
5	Revisió d'objectius terapèutics
6	Monitorització de malalts amb tractament anticoagulant oral
7	Educació específica a malalts en tractament amb anticoagulants orals
8	Monitorització del potassi sèric en malalts en tractament amb IECA
9	Monitorització de malalts en tractament diürètic
10	Evitar propoxifè
11	Evitar l'ús crònic i dosis altes de benzodiazepines
12	Evitar l'ús de medicaments anticolinèrgics
13	Evitar barbitúrics
14	Evitar meperidina
15	Evitar l'ús crònic de ketorolac
16	Evitar ticlopidina
17	Tractar l'anèmia ferropènica amb dosis baixes de ferro
18	Monitorització de tractaments antipsicòtics
19	Paracetamol a dosis superiors a 3g
20	Aspirina i AINE cal considerar factors de risc de hemorràgia digestiva alta
21	Considerar la necessitat de profilaxis de la hemorràgia digestiva alta en malalts amb factors de risc i tractament amb aspirina i AINE