

TAULA 6. Tractament que s'hauria de considerar indicat en el malalt geriàtric**SISTEMA CARDIO-VASCULAR**

| | |
|---|--|
| 1 | Anticoagulants orals en malalts amb fibril·lació auricular |
| 2 | Aspirina en malalts amb fibril·lació auricular on els anticoagulants orals estan contraindicats |
| 3 | Aspirina o clopidogrel en malalts amb antecedents de malaltia ateroscleròtica coronària, cerebral o perifèrica en ritme sinusal |
| 4 | Teràpia antihipertensiva en malalts amb tensió sistòlica superior a 16mm Hg |
| 5 | Estatines en malalts amb antecedents documentats de malaltia vascular coronària, cerebral o perifèrica amb estatus funcional independent per les activitats de la vida diària i una esperança de vida superior a 5 anys |
| 6 | IECA en malalts amb insuficiència cardíaca crònica |
| 7 | IECA en malalts després d'infart de miocardi |
| 8 | Beta blocadors adrenèrgics en malalts amb angina estable crònica |

SISTEMA RESPIRATORI

| | |
|---|--|
| 1 | Beta adrenèrgic estimulants o anticolinèrgics inhalats en malalts amb asma o MPOC fins i tot lleu o moderat |
| 2 | Corticoides inhalats de forma continuada en malalts amb asma o MPOC, FEV1 < 50% |
| 3 | Oxigen domiciliari en malalts amb insuficiència respiratòria tipus I (pO2 < 60mmHg, pCO2 < 49mm Hg) o insuficiència respiratòria tipus II (pO2 < 60mm Hg, pCO2 > 49mm Hg) |

SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

| | |
|---|--|
| 1 | L-dopa en malaltia de Parkinson idiopàtica amb alteració funcional que genera discapacitat |
| 2 | Antidepressius en presència de símptomes depressius moderats/greus de durada al menys de tres mesos |

APARELL GASTROINTESTINAL

| | |
|---|--|
| 1 | Inhibidors de la bomba de protons en malalts amb reflux gastro-esofàgic greu o malaltia péptica que requereix dilatació |
| 2 | Suplements de fibra en malalts amb malaltia diverticular amb constipació |

SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC

| | |
|---|---|
| 1 | Modificadors de malaltia antireumàtica en pacients amb malaltia reumatoide moderada/greu de més de 12 setmanes |
| 2 | Bifosfonats en malalts a qui s'administra corticoides de forma continuada |
| 3 | Calci i vitamina D en malalts amb osteoporosi |

SISTEMA ENDOCRÍ

| | |
|---|---|
| 1 | Metformina en malalts amb diabetis tipus II ± síndrome metabòlica en absència d'insuficiència renal amb depuració de creatinina superior a 50ml/min |
| 2 | IECA o ARA II en malalts diabètics amb nefropatia (proteinúria o microalbuminúria (>30mg/24h) ± insuficiència renal depuració de creatinina inferior a 50ml/min) |
| 3 | Antiagregants plaquetaris en malalts amb diabetis i factors de risc cardiovascular |
| 4 | Estatines en malalts diabètics si hi ha present factors de risc cardiovascular |

